
GEOMETRÍA PROYECTIVA

Segundo Cuatrimestre — 2011

Práctica 1: Curvas planas

1. La *lemniscata*.. Sea $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ la función

$$\alpha(t) = \left(t \frac{1+t^2}{1+t^4}, t \frac{1-t^2}{1+t^4} \right).$$

- (a) La curva α es diferenciable, regular y simple.
- (b) Determine $\lim_{t \rightarrow -\infty} \alpha(t)$ y $\lim_{t \rightarrow +\infty} \alpha(t)$ y concluya que α no es un homeomorfismo entre \mathbb{R} y su traza.

2. Un disco circular de radio 1 rueda en el plano xy y sin resbalar sobre el eje x . La figura descrita por un punto fijo sobre la circunferencia del disco se llama *cicloide*.

- (a) Obtenga una parametrización del cicloide y determine sus puntos singulares.
- (b) Calcule la longitud de arco del cicloide correspondiente a una rotación completa del disco.

3. Sea $\alpha : (0, \pi) \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por

$$\alpha(\theta) = \left(\sin(\theta), \cos(\theta) + \log\left(\tan\left(\frac{\theta}{2}\right)\right) \right).$$

La traza de α es llamada *tractriz*.

- (a) La curva α es diferenciable pero no regular.
- (b) La longitud del segmento de la tangente de la tractriz entre el punto de tangencia y la intersección con el eje y es siempre 1.

4. Sea $\alpha : (-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por

$$\alpha(t) = \left(\frac{3at}{1+t^3}, \frac{3at^2}{1+t^3} \right).$$

- (a) α es tangente al eje x en $t = 0$.
- (b) Se tiene que $\lim_{t \rightarrow +\infty} \alpha(t) = (0, 0)$ y $\lim_{t \rightarrow +\infty} \alpha'(t) = (0, 0)$.
- (c) Cuando $t \rightarrow -1$ esta curva y su tangente se aproximan a la recta $x + y + a = 0$.

La figura que se obtiene completando la curva con su simétrica respecto de la recta $y = x$ se llama *folio de Descartes*.

5. Sean $a > 0$ y $b < 0$, y consideremos la curva $\alpha(t) = (ae^{bt} \cos(t), ae^{bt} \sin(t))$. Esta curva se llama *espiral logarítmica*.

- (a) Es $\lim_{t \rightarrow +\infty} \alpha(t) = (0, 0)$, y cuando $t \rightarrow +\infty$ la curva sigue una trayectoria que envuelve al origen infinitas veces.
- (b) Por otro lado, $\lim_{t \rightarrow +\infty} \alpha'(t) = (0, 0)$ y $\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_{t_0}^t |\alpha'(t)| dt$ es finito. Por lo tanto, α tiene longitud de arco finita en $[t_0, +\infty)$.

6. Sea α una curva que no pasa por el origen. Si $\alpha(t_0)$ es el punto de su traza más próximo al origen y $\alpha'(t_0) \neq 0$, entonces $\alpha(t_0)$ y $\alpha'(t_0)$ son vectores ortogonales.
7. Si todas las normales a una curva parametrizada por longitud de arco pasan por un punto fijo entonces la traza de la curva está contenida en un círculo.
8. Sea $\alpha(s) = (\alpha_1(s), \alpha_2(s))$ una curva parametrizada por longitud de arco. Sea $\mathbf{t} = \alpha'$ la *tangente* de α y sea \mathbf{n} , la *normal* de α , el único vector unitario tal que $\{\mathbf{t}, \mathbf{n}\}$ es una base ortonormal orientada de \mathbb{R}^2 . La *curvatura* de α es el único escalar κ tal que

$$\mathbf{t}' = \kappa \cdot \mathbf{n}. \quad (1)$$

- (a) La curvatura de α es el área (con signo) del rectángulo definido por el par ordenado de vectores $\{\mathbf{t}, \mathbf{t}'\}$. Encuentre una expresión explícita para κ en función de α_1, α_2 y sus derivadas.
- (b) Los vectores \mathbf{t}' y \mathbf{n}' son ortogonales.
- (c) La función $|\kappa|$ es constante e igual a $1/r$ si y sólo si la curva α está contenida en una circunferencia de radio r .

Notemos que tomando módulos en (1) se deduce la expresión conocida

$$|\kappa| = |\mathbf{t}'| = |\alpha''|.$$

9. De la expresión $\kappa_\alpha = \alpha'_1 \alpha''_2 - \alpha'_2 \alpha''_1$ para la curvatura κ_α de una curva α parametrizada por longitud de arco obtenida en el ejercicio anterior, deduzca —utilizando la regla de la cadena— la siguiente expresión para la curvatura κ_c de una curva c regular no necesariamente parametrizada por longitud de arco:

$$\kappa_c = \frac{c'_1 c''_2 - c'_2 c''_1}{[(c'_1)^2 + (c'_2)^2]^{3/2}}.$$

10. Sea $k : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable definida sobre un intervalo abierto $I \subseteq \mathbb{R}$. Fijemos $s_0 \in I$ y definamos una nueva función $\theta : I \rightarrow \mathbb{R}$ poniendo $\theta(s) = \int_{s_0}^s k(s) ds$ para cada $s \in I$. Entonces la curva $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por

$$\alpha(s) = \left(\int_{s_0}^s \cos \theta(s) ds, \int_{s_0}^s \sin \theta(s) ds \right)$$

para cada $s \in I$, tiene curvatura k y que está determinada unívocamente a menos de un movimiento rígido del plano.

11. Fijemos una curva, dada en coordenadas polares por la ecuación $\rho = \rho(\theta)$, con $\rho : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función suficientemente diferenciable. Entonces la longitud de la curva es

$$\int_a^b \sqrt{\rho(\theta)^2 + \rho'(\theta)^2} d\theta$$

y su curvatura, como función de θ , es

$$k = \frac{2\rho'^2 - \rho\rho'' + \rho^2}{(\rho'^2 + \rho^2)^{3/2}}.$$

12. Sea $\alpha : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva parametrizada por longitud de arco cuya curvatura no se anula. Si $s_0 \in (a, b)$, se llama *centro de curvatura de α en s_0* al punto

$$x(s_0) = \alpha(s_0) + \frac{1}{\kappa(s_0)}n(s_0)$$

y se llama *círculo osculador a α en s_0* al círculo centrado en $x(s_0)$ cuyo radio es $\rho(s_0) = |\kappa(s_0)|^{-1}$. Muestre que la curva α y el círculo osculador a α en s_0 tienen contacto de segundo orden en $\alpha(s_0)$ y que, en particular, ambos tienen la misma tangente.

13. Determine los centros de curvatura y los círculos osculadores de la elipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

14. La tangente a un punto del lugar geométrico de los centros de curvatura de una curva α tiene la dirección de la normal a α en su punto correspondiente. La longitud del arco subtendido por dos puntos de aquél es igual a la diferencia de los radios de curvatura de los puntos correspondientes de α .



Isaac Newton
1643–1727, Inglaterra

Newton introdujo, en 1671, el círculo de curvatura de manera precisa—la idea venía de Kepler, una generación antes— y dio la fórmula usual para la curvatura en su libro *De Methodis Serierum et Fluxionum*.