

# ECUACIONES POLINOMIALES Y ALGORITMOS

## SEGUNDO CUATRIMESTRE 2015– PRÁCTICA 1

En lo que sigue notamos  $\mathbb{K}[\mathbf{X}] := \mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ , donde  $\mathbb{K}$  es un cuerpo.

- (1) Estructura de espacio vectorial del anillo de polinomios con coeficientes en  $\mathbb{K}$ :
  - (a) Probar que  $\mathbb{K}[\mathbf{X}]$  tiene una estructura de  $\mathbb{K}$ -espacio vectorial y exhibir una base.
  - (b) Un polinomio de grado  $d$  en 1 variable tiene a lo sumo  $d + 1$  coeficientes no nulos, o monomios. ¿ Cuántos coeficientes puede tener un polinomio de grado  $d$  en 2 variables ?
  - (c) ¿ Cuántos coeficientes no nulos puede tener un polinomio homogéneo de grado  $d$  en  $n$  variables ?
  - (d) ¿ Cuántos coeficientes no nulos puede tener un polinomio cualquiera de grado  $d$  en  $n$  variables ?
  - (e) ¿Cuál es la dimensión del  $K$ -espacio vectorial  $\mathbb{K}[\mathbf{X}]_{\leq d} = \{f \in \mathbb{K}[\mathbf{X}] \text{ tal que } \text{gr } f \leq d\}$ .
- (2) Sea  $f \in \mathbb{C}[x]$  un polinomio univariado no nulo y llamemos  $f_{red} := \frac{f}{\text{mcd}(f, f')}$ . Probar que  $f_{red}$  tiene las exactamente las mismas raíces que  $f$ , pero simples.
- (3) Sean  $f_1, \dots, f_s \in \mathbb{C}[x]$  no nulos. Sea  $g \in \langle f_1, \dots, f_s \rangle$  mónico de grado mínimo en el ideal  $\langle f_1, \dots, f_s \rangle$ . Probar que  $g = \text{mcd}(f_1, \dots, f_s)$ . Deducir que existen  $g_1, \dots, g_s \in \mathbb{C}[x]$  tales que  $\text{mcd}(f_1, \dots, f_s) = g_1 f_1 + \dots + g_s f_s$ .

Dados  $f_1 = x^4 - 7x + 6, f_2 = x^2 + 5x - 6$ , hallar  $g := \text{mcd}(f_1, f_2)$  y  $g_1, g_2$  tales que  $g = g_1 f_1 + g_2 f_2$ , a partir del algoritmo de Euclides.
- (4) Probar que el ideal  $\langle x, y \rangle \subset \mathbb{K}[x, y]$  no es principal.
- (5) Sean  $f_1, \dots, f_s \in \mathbb{C}[x]$ . Probar que las siguientes afirmaciones son equivalentes:
  - (a) Los polinomios  $f_1, \dots, f_s$  no tienen ceros comunes.
  - (b)  $\text{mcd}(f_1, \dots, f_s) = 1$
  - (c) Existen polinomios  $h_1, \dots, h_s \in \mathbb{C}[x]$  tales que  $1 = \sum_i h_i f_i$ . (es decir,  $1 \in \langle f_1, \dots, f_s \rangle$ , con lo que  $\langle f_1, \dots, f_s \rangle = \mathbb{C}[x]$ ).Valen estas equivalencias en  $\mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$  para todo  $n$ ?
- (6) Recordemos que un subconjunto de  $\mathbb{K}^n$  es una (sub)variedad algebraica (afín) de  $\mathbb{K}^n$  si es el conjunto de ceros comunes de polinomios en  $\mathbb{K}[\mathbf{X}]$ .
  - (a) Probar que si  $S \subset \mathbb{K}$  es una variedad algebraica propia, entonces  $S$  tiene finitos elementos.
  - (b) Probar que el cuadrante  $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0, y > 0\}$  no es una subvariedad algebraica de  $\mathbb{R}^2$ .
  - (c) Probar que si un polinomio  $f \in \mathbb{Q}[\mathbf{X}]$  se anula sobre todos los puntos de  $\mathbb{Z}^n$  (los puntos con coordenadas enteras), entonces  $f$  es el polinomio nulo.
  - (d) Probar que pasa lo mismo si  $f$  se anula en el conjunto :
$$\{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{Z}^n \text{ tq } 0 \leq x_i \leq \text{gr } f, 1 \leq i \leq n\}$$
  - (e) ¿Cuál es la menor subvariedad algebraica de  $\mathbb{C}^n$  que contiene a  $\mathbb{Z}^n$ ?
- (7) El objetivo de este ejercicio es demostrar que todas las curvas con parametrizaciones polinomiales  $(f(t), g(t)) \subset \mathbb{K}^2$  están contenidas en variedades algebraicas propias:
  - (a) Mostrar que si  $f, g \in \mathbb{K}[t]$  son polinomios de grado menor o igual que  $n$ , entonces para todo  $m \in \mathbb{N}$  suficientemente grande, el conjunto de polinomios  $\{f(t)^e \cdot g(t)^{e'}, e \geq 0, e' \geq 0, e + e' \leq m\}$  es linealmente dependiente en  $\mathbb{K}[t]$ .

- (b) Deducir que si  $C = \{(f(t), g(t)), t \in \mathbb{K}\}$  es una parametrización polinomial de la curva, entonces existe  $f \in \mathbb{K}[x, y]$ ,  $f \neq 0$ , tal que  $C \subset V(f)$ .
- (c) Lo anterior se puede generalizar fácilmente a cualquier curva  $C \subset \mathbb{C}^3$  con parametrización polinomial. Por ejemplo, encontrar  $f \in \mathbb{C}[x, y, z]$  no nulo tal que  $V := \{(t^5, t^2, t^3) : t \in \mathbb{C}\} \subset V(f)$ . Más aún, probar que  $V$  es una variedad algebraica (afín), es decir, describir  $V$  como los ceros comunes de un conjunto finito de polinomios.
- (8) Probar que si  $f_1, \dots, f_s, g_1, \dots, g_t \in \mathbb{K}[\mathbf{X}]$  son tales que  $\langle f_1, \dots, f_s \rangle = \langle g_1, \dots, g_t \rangle$ , entonces  $V(f_1, \dots, f_s) = V(g_1, \dots, g_t)$ . Investigar la recíproca.
- (9) Probar las siguientes igualdades de ideales en  $\mathbb{Q}[X, Y]$  :
- $\langle X + Y, X - Y \rangle = \langle X, Y \rangle$ .
  - $\langle aX + bY, cX + dY \rangle = \langle X, Y \rangle$  si  $ad - bc \neq 0$ ,  $a, b, c, d \in \mathbb{Q}$ .
  - $\langle X + XY, Y + XY, X^2, Y^2 \rangle = \langle X, Y \rangle$ .
  - $\langle 2X^2 + 3Y^2 - 11, X^2 - Y^2 - 3 \rangle = \langle X^2 - 4, Y^2 - 1 \rangle$ .