

Práctica 8: Integración

Integración en una variable (repaso)

1. Calcular:

$$\begin{array}{lll} \text{(a)} \int x \operatorname{sen} x \, dx. & \text{(c)} \int x e^{x^2} \, dx. & \text{(e)} \int \frac{3x - 2}{x^2 + x - 2} \, dx. \\ \text{(b)} \int \operatorname{sen}^2 x \cos x \, dx. & \text{(d)} \int e^x \operatorname{sen} x \, dx. & \text{(f)} \int \ln x \, dx. \end{array}$$

2. Hallar el área encerrada por las curvas:

- (a) $y = x^3$ e $y = x$.
- (b) $y = x^3 - x$ y la recta tangente a esta curva en $x = -1$.
- (c) $y = 2x^3 - 9x^2 + 12x + 1$ y la recta $y = 12$ entre $x = 0$ y $x = 3$.
- (d) $y = \operatorname{sen} x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2\pi$.

3. (a) Calcular $\int_{-2}^0 e^x \, dx$.

- (b) Hallar el área encerrada por las curvas: $y = 0$, $y = -2$, $y = \log x$ y $x = 0$.
Sugerencia: Dibujar la región y usar a).

4. Calcular:

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \int_{-2}^3 x^2 - 1 \, dx. & \text{(c)} \int_{-2}^3 |x^2 + 1| \, dx. \\ \text{(b)} \int_{-2}^3 |x^2 - 1| \, dx. & \text{(d)} \int_1^4 \sqrt{|x - 3|} \, dx. \end{array}$$

Integrales dobles

5. Evaluar cada una de las integrales siguientes si $R = [0, 1] \times [0, 1]$:

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \iint_R (x^3 + y^2) \, dx \, dy. & \text{(d)} \iint_R \ln[(x + 1)(y + 1)] \, dx \, dy. \\ \text{(b)} \iint_R y e^{xy} \, dx \, dy. & \text{(e)} \iint_R (x^m y^n) \, dx \, dy, \text{ donde } m, n > 0. \\ \text{(c)} \iint_R (xy)^2 \cos x^3 \, dx \, dy. & \text{(f)} \iint_R (ax + by + c) \, dx \, dy. \end{array}$$

$$(g) \iint_R \operatorname{sen}(x+y) \, dx dy. \quad (h) \iint_R (x^2 + 2xy + yx^{1/2}) \, dx dy.$$

6. Calcular el volumen del sólido acotado por el plano xz , el plano yz , el plano xy , los planos $x = 1$ y $y = 1$, y la superficie $z = x^2 + y^4$.
7. Sean f y g dos funciones continuas en $[a, b]$ y $[c, d]$, respectivamente. Mostrar que si consideramos el rectángulo $R = [a, b] \times [c, d]$ entonces

$$\iint_R [f(x)g(y)] \, dx dy = \left(\int_a^b f(x) \, dx \right) \left(\int_c^d g(y) \, dy \right).$$

8. Calcular el volumen del sólido acotado por la superficie $z = \operatorname{sen} y$, los planos $x = 1$, $x = 0$, $y = 0$, $y = \pi/2$ y el plano xy .
9. Sean $F \in \mathcal{C}^2$ y $f(x, y) = \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}(x, y)$. Calcular $\int_a^b \int_c^d f(x, y) \, dx dy$ en términos de F .
10. Graficar las regiones determinadas por los límites de integración de las siguientes integrales y calcular las integrales iteradas.

$$\begin{array}{ll} (a) \int_0^1 \int_0^{x^2} dy dx. & (g) \int_0^1 \int_0^{(1-x^2)^{1/2}} dy dx. \\ (b) \int_1^2 \int_{2x}^{3x+1} dy dx. & (h) \int_0^{\pi/2} \int_0^{\cos x} y \operatorname{sen} x \, dy dx. \\ (c) \int_0^1 \int_1^{e^x} (x+y) \, dy dx. & (i) \int_0^1 \int_{y^2}^y (x^n + y^m) \, dx dy \quad (m, n > 0). \\ (d) \int_0^1 \int_{x^3}^{x^2} y \, dy dx. & (j) \int_{-1}^0 \int_0^{2(1-x^2)^{1/2}} x \, dy dx. \\ (e) \int_{-3}^2 \int_0^{y^2} (x^2 + y) \, dx dy & (k) \int_0^{\pi} \int_0^{\operatorname{sen} y} y \, dx dy. \\ (f) \int_{-1}^1 \int_{-2|x|}^{|x|} e^{x+y} \, dy dx. & (l) \int_{-2}^0 \int_{x^3}^{x+1} (y^2 + 1) \, dy dx. \end{array}$$

11. Sea $f : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \text{ es racional} \\ 2y, & \text{si } x \text{ no es racional} \end{cases}$$

Mostrar que la integral iterada $\int_0^1 \left[\int_0^1 f(x, y) \, dy \right] dx$ existe pero f no es integrable. ¿Existe la otra integral iterada?

12. Calcular el área de:

- (a) la región limitada por la recta $y = x$ y por la curva $y = x^2$.
 (b) la región formada por todos los puntos (x, y) tales que $|x| + |y| \leq a$, $a \geq 0$.

13. Calcular

$$\iint_T (x \operatorname{sen} x + y \operatorname{sen} (x + y)) dx dy$$

siendo T el triángulo de vértices $(1, 0)$, $(0, 1)$ y $(3, 3)$.

14. Sea D la región acotada por los semiejes positivos de x e y y la recta $3x + 4y = 10$. Calcular

$$\iint_D (x^2 + y^2) dx dy.$$

15. Sea D la región acotada por el eje y y la parábola $x = -4y^2 + 3$. Calcular

$$\iint_D x^3 y dx dy.$$

16. Calcular el volumen de un cono de base de radio r y altura h .

17. Calcular el volumen de las siguientes regiones:

- (a) R : encerrada por la superficie $z = x^2 + y^2$ y el plano $z = 10$.
 (b) R : encerrada por el cono de altura 4 dado por $z^2 = x^2 + y^2$.
 (c) R : encerrada por las superficies $x^2 + y^2 = z$ y $x^2 + y^2 + z^2 = 2$.
 (d) R : determinada por $x^2 + y^2 + z^2 \leq 10$ y $z \geq 2$.

18. En las integrales siguientes, cambiar el orden de integración, graficar las regiones correspondientes y evaluar la integral por los dos caminos.

(a) $\int_0^1 \int_x^1 xy dy dx.$

(d) $\int_{-1}^1 \int_{|y|}^1 (x + y)^2 dx dy.$

(b) $\int_0^1 \int_1^{2-y} (x + y)^2 dx dy.$

(e) $\int_{-3}^3 \int_{-(9-y^2)^{1/2}}^{(9-y^2)^{1/2}} x^2 dx dy.$

(c) $\int_0^1 \int_{2x}^{3x} x^2 y dy dx.$

19. Calcular $\int_D y^2 x^{1/2} dx dy$ donde

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0, y > x^2, y < 10 - x^2\}$$

20. Sea D la región limitada por las rectas $y = 2$, $y = \frac{x}{2}$, $y = 2x$ e $y = 1$. Calcular la siguiente integral

$$\iint_D x^2 y dA$$

21. Sea $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1; \sqrt{x} \leq y \leq 1\}$ Calcular la siguiente integral

$$\iint_D \cos\left(\frac{x}{y}\right) dA$$

22. Calcular $\int_T e^{x-y} dx dy$ donde T es el triángulo con vértices $(0, 0)$, $(1, 3)$, y $(2, 2)$.

23. Sea T la región "triangular" limitada por las rectas $y = x$, $y = \sqrt{2}$ y la curva $y = \sqrt{x}$. Calcular

$$\iint_R e^{\frac{x}{y}} dA.$$

Integrales triples

24. Calcular:

(a) $\iiint_C (xyz + x^2 y^2 z^2) dV$, donde $C = [0, 1] \times [-3, 2] \times [-1, 1]$.

(b) $\iiint_C (x \cos z + y \cos x + z \cos y) dV$, donde $C = [0, \pi] \times [0, \pi] \times [0, \pi]$.

25. Calcular:

(a) $\iiint_W x dV$, donde W es la región limitada por, $x = 0$, $y = 0$, $z = 2$, $z = x^2 + y^2$.

(b) $\iiint_W x^2 \cos z dV$, donde W es la región limitada por, $z = 0$, $z = \pi$, $y = 0$, $x = 0$, $x + y = 1$.

(c) $\iiint_W dV$, donde W es la región limitada por, $z = x^2 + 3y^2$ y $z = 9 - x^2$.

(d) $\iiint_W (x + y + z) dV$, donde $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \|(x, y, z)\| \leq 1\}$.

(e) $\iiint_W (x^3 + y + z) dV$, donde $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z \in [0, 1], x^2 + y^2 \leq 1\}$.

26. Calcular $\int_0^1 \int_0^{2x} \int_{x+y}^{x^2+y^2} dz dy dx$ y graficar la región de integración.

27. Cambiar el orden de integración en

$$\int_0^1 \int_0^x \int_0^y f(x, y, z) dz dy dx$$

para obtener otras cinco formas de realizar la misma integración. Graficar la región de integración.

28. Sea $B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \|(x, y, z)\| \leq 1\}$. Demostrar que si f es una función continua en B , impar respecto de z (es decir $f(x, y, z) = -f(x, y, -z)$), entonces $\iiint_B f(x, y, z) dV = 0$. ¿Para que otras regiones vale este resultado? (dar ejemplos).

29. Sea W la región determinada por las condiciones $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$ y $0 \leq z \leq xy$.

(a) Hallar el volumen de W .

(b) Calcular $\int_W x dx dy dz$.

(c) Calcular $\int_W y dx dy dz$.

(d) Calcular $\int_W z dx dy dz$.

(e) Calcular $\int_W xy dx dy dz$.